

# Эктоцидол 600

**Лекарственная форма:** раствор для обмывания, эмульсионный концентрат, применяется в ветеринарии.

**Состав:** 1 мл содержит: диазинон 600 мг.

**Форма выпуска:** в ампулах по 4 мл, полиэтиленовых флаконах по 100 мл и болиэтиленовых бутылках по 1 л.

**Фармакотерапевтическая группа:** эктопаразитическое инсектоакарицидное средство.

**Показания к применению:** Применяется против прософтоза у крупного рогатого скота и овец, саркоптоза у свиней, наружных энтомозов животных, а также для уничтожения наружных кровососов – клещей, мух и прочих эктопаразитов, для дезинсекции и деакаризации в стойлах у животных и птиц.

Способ применения и дозировка

Применяется для обмывания и опрыскивания.

**Крупный рогатый скот:** для обмывания 10 мл/24 л воды, для опрыскивания 1 мл на 2,4 л.

**Овцы:** для опрыскивания 1 мл препарата, разведенный в 2,4 л воды. Для обмывочного бака 10 мл препарата на 8 л воды.

**Свиньи:** для опрыскивания 1 мл/2,4 л воды.

**Дезинсекция помещений:** 200 мл препарата на 5 л воды для опрыскивания площади в 100 м<sup>2</sup>.

Эктоцидол 600 применяется в виде водной эмульсии. Эмульсию для использования следует готовить непосредственно перед обработкой.

Приготовление раствора: необходимое количество препарата предварительно растворить в небольшом количестве воды, хорошо взболтать и долить оставшееся количество воды.

**Опрыскивание:** животное должно быть полностью смочено раствором.

Обмывание: животное следует обмывать в течение 1 минуты. Необходимо один раз обмыть голову. Овец следует обмыть через 15 дней после стрижки. Обмывочные баки должны быть использованы в день приготовления раствора в местах, где обнаружен листериоз.

Частота обработок зависит от вида паразита, климатических условий и степени инфекционного процесса.

Свиньям обработка на чесоточного клеща может потребоваться дважды с интервалом в 7-10 дней, при этом необходима обработка стойл.

Стойла: для контроля за паразитами необходимо обработать стойла. Против блох стойла следует обработать 2 раза с интервалом в 10-15 дней.

**Условия хранения:** Препарат хранить в хорошо проветриваемом, защищенном от света и сырости месте, недоступном для детей и домашних животных в фабричной упаковке при температуре не выше 25°C. После вскрытия упаковки его содержимое употребляется в течение 3 месяцев. После употребления хорошо упаковать. Его кристаллизация означает деградацию продукта.

**Срок годности:** 3 года.

**Страна-производитель:** БИОТЕКС, Грузия.