

ЯМ БК мазь (Unguentum Yam BK)

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Мазь ЯМ БК — фунгицидно-бактерицидный препарат, в состав которого входят: салициловая кислота, окись цинка 10%, сера 10%, деготь, креолин бесфенольный каменноугольный, ланолин, скипидар и вазелин. Препарат представляет собой однородную массу густой плотной консистенции, с резким неприятным креолиновым запахом, от серого до коричневого разных оттенков цвета, при хранении может расслаиваться. Мазь выпускают расфасованной в пластиковых банках по 50, 90, 150, 180, 500 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мазь ЯМ БК активна в отношении возбудителей трихофитии и чесотки, эффективна при экземе, дерматитах и других заболеваниях кожи. Входящие в состав мази компоненты обладают акарицидной и фунгицидной активностью; антацидным, антисептическим, кератолитическим, вяжущим свойствами, что способствует быстрейшему выздоровлению. Препарат малотоксичен для теплокровных животных, не обладает раздражающим и сенсibiliзирующим действиями.

ПОКАЗАНИЯ

Применяют животным для лечения экзем, дерматитов, трихофитии и других заболеваний кожи.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением мазь тщательно перемешивают и наносят тонким слоем на пораженный участок кожи и на 2-4 см вокруг него без предварительного удаления корочек и выстригания шерсти; при этом ее слегка втирают в обрабатываемую поверхность. Пораженные участки обрабатывают 1-2 раза в день до отделения корочек. Если последние через 4-5 дней не отделились, втирание мази продолжают. Обычно через 7-10 дней пораженные участки освобождаются от корочек, и на них наблюдается рост волос. Через 10 дней после обработки проводят контрольные микроскопические исследования соскобов с пораженных участков кожи. При обнаружении возбудителей заболевания лечение повторяют.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Применение мази ЯМ БК не оказывает побочного действия и не вызывает осложнений.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний для использования препарата не установлено.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

При работе с препаратом соблюдают правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для ветеринарных препаратов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В хорошо закупоренной таре, в сухом и темном месте при температуре от 0 до 30 °С. Срок годности — 2 года.