



ЗАО «МОСАГРОГЕН»

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата ПНЕВМОСТОП-О®
для лечения свиней и сельскохозяйственных птиц при
болезнях бактериальной этиологии

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Россельхознадзора
Непоклонов Е.А
21 марта 2013 г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Пневмостоп®-О (Pnevmostop-O).
Международное непатентованное наименование: флорфеникол.
2. Лекарственная форма: раствор для орального применения.
В 1 мл препарата содержится 100 мг флорфеникола и вспомогательные вещества. Препарат фасуют по 1 л в полиэтиленовые канистры соответствующей вместимости, которые закрывают резьбовыми пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия.
3. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.
4. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 2 года с даты производства. После первого вскрытия упаковки – 30 суток. Запрещается применение препарата по истечении срока годности. Утилизация неиспользованного препарата производится в соответствии с требованиями законодательства

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Пневмостоп-О® относится к антибактериальным препаратам группы амфениколов (АТХ QJ01BA90). Флорфеникол является производным тиамфеникола, в молекуле которого гидроксильная группа заменена атомом фтора. Обладает широким спектром бактериостатического действия, активен в отношении *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *Bordetella bronchiseptica*, *Haemophilus* spp., *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinis*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp., *Shigella* spp., *Klebsiella* spp., *Proteus* spp., в том числе в отношении бактерий, которые производят ацетилтрансферазу и являются устойчивыми к хлорамфениколу. Связываясь в протоплазме бактериальной клетки с рибосомальной субъединицей 50S, блокирует фермент пептидилтрансферазу, что приводит к торможению синтеза белка у чувствительных микроорганизмов на уровне рибосом. При пероральном введении флорфеникол интенсивно всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает во все органы и ткани. Биодоступность флорфеникола после перорального введения составляет у свиней до 88%, у птиц около 55%. Максимальная концентрация антибиотика в крови свиней и птиц достигается через 1 - 3 часа. Терапевтическая концентрация в органах и тканях сохраняется в течение 24 часов. Флорфеникол и его метаболиты выделяются из организма птиц преимущественно с пометом, из организма свиней – с мочой и в меньшей степени с фекалиями: 50% в неизменной форме и 50% в виде метаболитов, основным из которых является флорфениколамин. При концентрации флорфеникола в воде свыше 1 г на 1 литр он может выпадать в осадок. Пневмостоп®-О по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

6. Пневмостоп®-О назначают свиньям и сельскохозяйственным птицам с лечебной и лечебно-профилактической целью при инфекционных заболеваниях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу, в том числе:
 - свиньям при плевропневмонии, вызванной *Actinobacillus pleuropneumoniae* и/или *Haemophilus parasuis*, атрофическом рините, вызванном *Pasteurella multocida* и *Bordetella bronchiseptica*;

- птицам при колибактериозе, пастереллезе, стафилококкозе, болезнях органов дыхания, вызванных *Ornitobacterium rhinotracheale*.
7. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата. Запрещается применять Пневмостоп®-О курам-несушкам, в связи с накоплением флорфеникола в яйцах.
 8. Пневмостоп®-О применяют свиньям перорально с водой для поения в суточной дозе 5 мг флорфеникола на 1 кг массы животного, что соответствует 5 мл препарата на 100 кг массы животного в течение 7 дней.
Птицам применяют с водой для поения в суточной дозе 20 мг флорфеникола на 1 кг массы животного, что соответствует: цыплятам до 4-недельного возраста – 100 мл препарата на 100 л воды; другим возрастным категориям – 200 мл препарата на 100 л воды. Курс применения препарата 3 дня, при сальмонеллезе 5 дней.
В период лечения свиньи и птицы должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. В случае если это невозможно, суточную дозу препарата делят на 2 равные части и выпаивают с интервалом 12 часов. Лечебный раствор готовят ежедневно из расчета суточной потребности животных в воде.
 9. В случае передозировки препарата возможно уменьшение потребления корма и воды, снижение привесов, у свиней – перианальная эритема и отек. Указанные симптомы самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств.
 10. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.
 11. При применении Пневмостопа®-О в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные и симптоматические препараты.
 12. Не допускается одновременное применение Пневмостопа®-О с тиамфениколом, хлорамфениколом, антибиотиками группы пенициллина, цефалоспоридами и фторхинолонами.
 13. Убой свиней и птиц на мясо разрешается не ранее, чем через 6 суток после последнего применения Пневмостопа®-О. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям после термической обработки.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

14. При работе с Пневмостопом®-О следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.
15. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Пневмостопом®-О. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).
16. Пустые канистры из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Регистрационный номер 77-3-2.13-1298№ПВП-3-2.13/02910



**Производитель: ЗАО "Мосагроен",
117545, Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.1
www.mosagroen.ru
тел/факс: (495) 744-06-45 (многоканальный)**

3