



ЗАО «МОСАГРОГЕН»

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Тривит[®] раствора для инъекций для профилактики гиповитаминозов у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Россельхознадзора
Непоклонов Е.А

28 февраля 2012 г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Тривит[®] (Trivit[®]).
Международное непатентованное наименование: масляный раствор витаминов А, D₃, Е.
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.
Тривит[®] в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: ретинола (витамина А) ацетата или пальмитата – 30000 МЕ, холекальциферола (витамина D₃) - 40000 МЕ, альфа-токоферола (витамина Е) ацетата - 20 мг, а также масло растительное.
По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета со свойственным растительному маслу запахом.
3. Тривит[®] выпускают расфасованным в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренных резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.
4. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства. Запрещается использование препарата после окончания срока его годности.
5. Тривит[®] следует хранить в недоступном для детей месте.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Тривит[®] относится к группе витаминных препаратов. Оказывает комплексное действие на организм животных и птицы, выражающееся в нормализации обмена веществ, профилактике гипо- и авитаминозов А, D₃ и Е и заболеваний, развивающихся на их фоне.
Тривит[®] по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

8. Тривит[®] в виде инъекционного раствора применяют для профилактики гиповитаминозов у сельскохозяйственных животных и птицы. Препарат показан при ксерофтальмии, рахите, остеомалации и функциональных расстройствах плодовитости животных и птиц. Рекомендуются использовать при беременности, лактации, а также в период реабилитации организма после болезни.
9. Противопоказаний не выявлено.

10. Препарат вводят животным и птице внутримышечно или подкожно 1 раз в неделю в течение месяца в дозах, указанных в таблице. При необходимости инъекции препарата повторяют через месяц.

| Вид животных | Внутримышечно или подкожно, мл/голову |
|----------------------|---------------------------------------|
| Крупный рогатый скот | 2,0 – 5,0 |
| Лошади | 2,0 – 2,5 |
| Жеребята, телята | 1,5 – 2,0 |
| Овцы, козы | 1,0 – 1,5 |
| Ягнята, поросята | 0,5 – 1,0 |
| Свиньи | 1,5 – 2,0 |
| Куры | 0,1 – 0,2 |
| Собаки | 0,5 – 1,0 |
| Кролики | 0,2 – 0,3 |

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.
 12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.
 13. При случайном увеличении интервала между двумя введениями препарата, его следует ввести как можно скорее в предусмотренной дозировке.
 14. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у сельскохозяйственных животных и птицы, как правило, не наблюдается.
 15. Применение Тривита[®] инъекционного раствора не исключает использование других лекарственных средств.
 16. Продукцию животноводства и птицеводства после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с Тривитом[®] инъекционным раствором следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.
 18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Тривитом[®]. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).
 19. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-2.12-0568№ПВП-3-1.9/00004



Производитель: ЗАО "Мосагроен",
 117545, Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.1
www.mosagroen.ru
 тел/факс: (495) 744-06-45 (многоканальный)

5

Банковские реквизиты: ЗАО "Мосагроен", ИНН 5009002474,
 р/с 40702810600000000007 в ОАО МКБ "Дом-Банк" г. Домодедово,
 к/с 30101810400000000593, БИК 044552593, ОКОНХ 19310, ОКПО 18009711